


КОМБІКОРМ

Alpha Boar XXL



ЯК ОСНОВА ПРОГРАМИ ГОДІВЛІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

«ЕФЕКТИВНИЙ КНУР»



GROUP
INTELLIGENT FEEDING



ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРМУ ALPHA BOAR XXL



Готовий до
споживання
комбікорм



Повний контроль
на всіх етапах
виробництва



Стабільна поживність
та гарантія відсутності
мікотоксинів



Ефективність,
яка доведено
на український
свинокомплексах

ВЛАСТИВОСТІ КОРМУ



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ



Поживність, яка відповідає
сучасним вимогам
високопродуктивних кнурів
провідних генетичних компаній

Гарантія забезпечення кнурів всіма
поживними речовинами



Природне високоякісне джерело
омега-3 жирних кислот на основі
риб'ячого жиру шотландського
лосося, Агромега, Ірландія

Підвищення якості еякуляту




Застосування ефективних
та доведених на практиці
функціональних нутрієнтів
для кнурів: мікроелементи в
органічній формі, високий вміст
ва Вітаміну E та C, органічний Se,
L-карнітин

- Покращення обміну речовин
- Підвищення міцності опорно-рухового апарату: міцність кісток, ратиць
- Покращення процесу сперматогенезу (Zn, Se)
- Підвищення антиоксидантних та імуностимулюючих властивостей
- Зниження теплового стресу (вітамін C)



Застосування ефірної олії
орегано

Підвищення резистентності до
захворювань
Покращення антиоксидантного статусу
сперми та параметрів якості сперми



Застосування спеціального
комплексу органічних кислот

Зниження ризику розвитку патогенної
мікрофлори в сечостатевих шляхах

ХОЧЕТЕ БІЛЬШЕ ЗНАТИ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ КНУРІВ, ЩО
ВХОДЯТЬ ДО КЛАДУ **ALPHA BOAR XXL**? СКАНУЙТЕ QR КОД!



ПРОГРАМА ГОДІВЛІ* «ЕФЕКТИВНИЙ КНУР» ЗАБЕЗПЕЧУЄ:



Підвищення
якості еякуляту:
об'єм, кон-
центрація,
життєздатність
та активність
сперматозоїдів



Суттєве
зменшення
випадків
некондиційного
еякуляту



Більш
довготривале
використання
кнурів та
зниження
ризиків
вибраковки
кнурів



Високий статус
здоров'я кнурів
та підвищення
опірності
організму



Значне
покращення
загальних
репродуктивних
показників на
господарстві.

* **кормове рішення, ефективність якого доведена на свинокомплексах**



Програма годівлі кнурів-плідників на основі комбікорму **Alpha Boar XXL** ефективно поєднує сучасні вимоги провідних генетичних компаній та забезпечує стабільне та довготривале використання кнурів-плідників.

СТРАТЕГІЯ ГОДІВЛІ КНУРЦІВ ВІД 110 КГ ТА **КНУРІВ ПЛІДНИКІВ**

Період	Вид корму	Кількість корму, кг	Призначення програми годівлі на кожному періоді
Кнурці 110 - кнурці за місяць до активного використання	<u>Варіант 1</u> Комбікорм лактуючий <u>Варіант 2</u> Комбікорм кнурів плідників ALPHA BOAR XXL	2,5-2,7	- Підтримання оптимальної кондиції - Підготовлення до активного використання
Кнури плідники	Комбікорм кнурів плідників ALPHA BOAR XXL	2,7-3,5 кг в залежності від кондиції	- Отримання якісної сперми - Покращення обміну речовин - Довготривалість продуктивного використання



НОТАТКИ/ФАКТИ ЩОДО ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ

- Термінальні кнури, такі як **Дюрок** і **П'єтрен** відомі своєю швидкістю росту та якістю м'яса, мають природну тенденцію до більшої концентрації сперми в еякуляті.
- Навпаки, материнські породи, такі як **Ландрас** і **Велика Біла**, що розводяться через їхню продуктивність і характеристики свиноматок, виробляють більший об'єм сперми, часто з меншою концентрацією.
- Згідно з дослідженнями, проведеними в університетах і на комерційних племінних фермах, термінальні 2-3 породні кнури зазвичай дають найвищу якість і кількість сперми ніж чистопородні термінальні лінії.
- Існує відмінність між спермо-продуктивністю кнурів в межах однієї породи, але різних генетичних компаній/країн.
- У свинарстві добре відомо, що коли температура перевищує 29 °C (85 °F) з вологістю 85% протягом більше ніж 10 днів, це негативно впливає на сперматогенез.
- Північно-європейські породи свиней мають меншу толерантність до теплового стресу, ніж породи, виведені вздовж екватора; чітко простежуються відмінності між генетичними лініями.
- Якість сперми кнура зазвичай покращується з віком приблизно до 3-4 років, після чого має тенденцію до зниження. Оптимальним віком для вироблення сперми кнура часто вважається 24-29 місяців.
- Кнури можуть демонструвати індивідуальні варіації у продукуванні та якості сперми, і деякі можуть зберігати хорошу якість сперми довше, ніж інші.
- Відомо, що гормональні зміни, зокрема зниження тестостерону, впливають на якість сперми з віком, демонструють індивідуальні варіації у виробництві та якості сперми, і деякі можуть зберігати хорошу якість сперми довше, ніж інші.
- У той час як обсяг еякуляту збільшується з віком, концентрація сперми може бути вищою у молодих кнурів. Деякі дослідження показують, що концентрація сперми стабілізується після певного віку.
- Незважаючи на те, що кнурів можна використовувати для штучного осіменіння в молодшому віці, згідно з деякими дослідженнями, оптимальним віком для максимального об'єму та концентрації сперми вважається приблизно 24-29 місяців.
- Високі концентрації сперми можуть призвести до зниження рухливості сперматозоїдів.
- Метіонін: дослідження показали, що метіонін може покращити якість і рухливість сперми.
- Такі умови, як інфекції або вакцини, які викликають підвищення температури у кнурів та запальні процеси у кнурів, можуть призвести до змін якості еякуляту, включаючи посилення аглютинації.
- Деякі дослідження показують, що якість сперми кнура, зокрема рухливість і концентрація сперми, може бути вищою навесні та взимку порівняно з іншими сезонами.
- Літо може бути пов'язане з нижчою якістю сперми, включаючи зниження рухливості сперматозоїдів, і деякі дослідження вказують на нижчу концентрацію сперми влітку порівняно з осінню.
- Деякі дослідження виявили значні відмінності між кнурами різного віку щодо стабільності хроматину, морфології та морфометрії голівки сперми. Також ряд дослідження показуються, що відсоток опоросу при штучному осіменінні вищий у зрілих та старих кнурів в порівнянні зі спермою молодих.

***Дана інформація зібрана з наукових та практичних дослідів, та може відрізнятися від даних на господарстві.